

TF. 600920328
cirujaen@cirujaen.es

PASO DE ESPAÑA N°3 PRIMERO J
23009 JAÉN



CIRUGÍA DE PARTES BLANDAS

Unidad de Cirugía MENOR Consulta CIRUJAÉN

Si durante **las primeras 48 horas tras el procedimiento**, observa signos de sangrado, fiebre alta o cualquier otro problema relacionado con la cirugía, **podrá contactar** con la CONSULTA DE CIRUGIA CIRUJAEN TF 600920328
Unidad de Cirugía Menor en horario de 16:00 a 20:00 h,

o acudir al Servicio de Urgencias de Referencia con su informe de alta.

Tratamiento Domiciliario:

- **PARACETAMOL 1 GRAMO:** 1 comprimido cada 8 horas por vía oral durante 3 días. Después, según necesidades.
- Si entre las dosis de Paracetamol tiene dolor, tome **ENANTYUM 25 MG ó IBUPROFENO 600 MG:** 1 comprimido cada 8 horas por vía oral (ALTERNANDO AMBOS MEDICAMENTOS CADA 4 HORAS)
- **OMEPRAZOL 20 MG:** 1 comprimido cada 24 horas por vía oral, antes del desayuno durante 3 días.
- **CURAR HERIDA CON CRISTALMINA 1 VEZ DIA**
- **ACUDIRA PARA RETIRAR LOS PUNTOS**

Firmado: